

非洲埃博拉疫情为何构成“国际关注的突发公共卫生事件”

新华社金沙萨5月17日电(新华社记者 史彧 刘方强) 世界卫生组织17日宣布,刚果(金)和乌干达出现的埃博拉疫情已构成“国际关注的突发公共卫生事件”,但未达到《国际卫生条例》规定的“大流行病突发事件”标准。根据世卫组织和非洲疾病预防控制中心的数据,本轮疫情已经报告至少80例死亡病例。

目前发生疫情地区情况如何?出现更大范围传播风险有多大?引发本轮疫情的是哪种埃博拉病毒?

疫区情况如何

根据刚果(金)卫生部的通报,本轮疫情的首例疑似病例为一名护士,出现发热、出血、呕吐和乏力等症状,4月在刚果(金)伊图里省一处医疗机构就诊后死亡。但非洲疾病预防控制中心主任让·卡塞亚16日在线上记者会上表示,目前尚未找到真正的首例病例。“这意味着我们还不知道此次疫情的规模到底有多大。”

非洲疾控中心认为,本轮疫情社区传播活跃,疫区接触者追踪薄弱,感染预防和控制存在不足。非洲疾控中心项目管理首席顾问恩贡戈表示,由于疫情监测和接触者追踪薄弱,目前判断疫情传播速度和病例增长情况为时尚早。

新华社记者15日在伊图里省鲁万帕拉综合医院看到,医务人员戴着口罩、身穿防护服以防院内感染风险。记者了解到,近期已有当地居民注意到出现了不明原因疾病、葬礼频繁。居民萨利雷·贾斯廷告诉记者,当地医疗机构不足,居民只能自行采取一些防护措施。另一名居民欧仁妮·塞米尔说,过去数周,当地已安葬10余名死者,但此

前并不清楚死因,他们担心还有不少接触者在社区中流动。

世卫组织公布的数据显示,截至16日,刚果(金)伊图里省已报告8例确诊病例、246例疑似病例和80例疑似死亡病例。而根据非洲疾控中心16日通报的数据,伊图里省已累计报告336例病例,死亡87例。

世卫组织在声明中表示,基于已报告病例和死亡病例数量,刚果(金)伊图里省等多地和乌干达已经发现病例,出现异常聚集性社区死亡病例和医护人员死亡病例,发生疫情地区持续的不稳定、人道主义危机、人口流动性高、城市或半城市性质等因素,本次埃博拉疫情事件“不同寻常”。

传播风险多大

刚果(金)伊图里省毗邻乌干达、南苏丹,人员和物资跨境流动频繁。本次发生疫情的该省蒙布瓦卢、鲁万帕拉以及首府布尼亚是重要商业和矿业活动地区。

刚果(金)卫生部长坎巴16日在首都金沙萨举行的记者会上说,蒙布瓦卢人员流动频繁,增加了疫情向邻近省份以及乌干达、南苏丹扩散风险。卫生团队已被派往伊图里省、邻近省份和边境地区,以追踪确诊病例接触者并遏制疫情扩散。

疫情的跨境传播风险已开始显现。乌干达卫生部15日宣布,一名59岁的刚果(金)男子日前在乌干达首都坎帕拉死亡,检测结果显示其感染本迪布焦型埃博拉病毒。世卫组织17日在声明中表示,坎帕拉日前已报告了2例来自刚果(金)的埃博拉确诊病例,这两例病例之间没有明显联系。

非洲疾控中心的风险评估认为,刚果(金)境内的风险“非常高”,东非地区风险“高”,非洲大陆范围内风险“中等”。卡塞亚表示,非洲疾控中心建议相关国家采取加强监测、追踪接触者、防控感染、沟通风险以及跨境协调等公共卫生措施。世卫组织表示,将尽快召开突发事件委员会会议,向受疫情影响国家提出防治措施建议。

病毒有何特点

世卫组织和非洲疾控中心表示,本轮疫情由本迪布焦型埃博拉病毒引发。据非洲疾控中心介绍,本迪布焦型病毒2007年在乌干达首次被发现并引发疫情。2012年,该型病毒在刚果(金)引发疫情。

与近年来更受关注的扎伊尔型埃博拉病毒相比,本迪布焦型埃博拉病毒相关研究基础较弱。恩贡戈指出,本迪布焦型埃博拉病毒并非新病毒,但由于已多年未引发疫情,相关研究进展不及扎伊尔型埃博拉病毒。扎伊尔型埃博拉病毒引发的疫情更多,因此疫苗、治疗手段和诊断工具研发更充分。本迪布焦型埃博拉病毒此次重新出现,是对公共卫生体系和科研体系的一次“提醒”。

非洲疾控中心主任首席顾问霍尔表示,一些候选疫苗正在被考虑用于本迪布焦型病毒,相关方案仍在制定中,但目前仍处于“早期阶段”。坎巴说,本迪布焦型埃博拉病毒致死率“可达50%”。本迪布焦型埃博拉病毒与扎伊尔型埃博拉病毒在部分临床表现上存在差异,通常以发热起病,出血症状出现较晚。

伊朗媒体曝光美国回应伊朗方案的五项条件

新华社德黑兰5月17日电(记者 陈霄 沙达提)据伊朗法尔斯通讯社17日报道,美国在回应伊朗方案时提出了五项条件,包括不向伊朗支付战争赔偿、要求将400公斤浓缩铀交给美国、仅允许伊朗保留一处核设施继续运行、拒绝解冻伊朗资产、所有战线停战都须以开展谈判为前提。

报道称,即便美方提出的条件得到满足,美国和以色列方面的相关军事威胁仍可能继续存在。

报道援引分析人士的观点称,美方方案并非着眼于从根本上解决争端,而是试图通过谈判实现其在军事行动中未能达成的目标。

报道还称,伊朗方面也提出五项“建立互信”的前提条件,包括全面停止冲突(尤其是在黎巴嫩方向)、解除对伊朗制裁、解冻伊朗资产、赔偿战争损失,以及承认伊朗在霍尔木兹海峡相关事务中的主权。

驻日美军一士兵涉嫌盗窃被日警方逮捕

新华社东京5月17日电(记者 陈泽安 梁晨)据日本共同社报道,一名驻日美国海军士兵17日因涉嫌盗窃钱包等物品而被当地警方逮捕。

报道说,这名美军士兵隶属于美军佐世保基地,其对部分指控表示否认。



5月17日,参会者在第十届中国—俄罗斯博览会展览现场了解俄罗斯食品。

5月17日,第十届中国—俄罗斯博览会迎来公众开放日。第十届中国博览会主题为“信任、合作、共赢”,由商务部、黑龙江省人民政府、俄罗斯经济发展部、俄罗斯工业和贸易部共同举办。本届博览会展览总面积5.5万平方米,46个国家和地区1500余家中外企业参展。

新华社记者 王建威 摄

一文读懂本迪布焦型埃博拉病毒

新华社北京5月17日电 世界卫生组织17日宣布,刚果(金)和乌干达出现的埃博拉疫情已构成“国际关注的突发公共卫生事件”。非洲疾病预防控制中心表示,此次疫情由本迪布焦型埃博拉病毒引发,但目前尚无针对该型病毒的疫苗和特异性治疗方法,疫情区域传播的风险较高。本迪布焦型埃博拉病毒又是怎样一种病毒?

据世卫组织发布的资料,1976年两起几乎同时暴发的疫情中首次发现埃博拉病毒:一起发生在现今南苏丹的恩扎拉;另一起出现在现今刚果(金)境内的埃博拉河附近,埃博拉病毒因此得名。埃博拉病毒是丝状病毒科、正埃博拉病毒属的病毒。迄今已确定6种正埃博拉病毒,其中3种已知可引起大规模埃

博拉疫情,包括扎伊尔型、苏丹型以及此次引发疫情的本迪布焦型。

蝙蝠科的果蝠被认为是埃博拉病毒的自然宿主。人类主要通过接触病患或被感染动物的血液、体液、分泌物、排泄物等感染。潜伏期为2至21天,初期症状包括发烧、疲劳、肌肉疼痛、头痛、喉咙痛等,随后可能出现呕吐、腹泻、腹痛、皮疹、肝肾功能受损等症状。感染者还可能出现意识混乱等神经系统症状。一般认为,感染者在出现症状前不会传播病毒。

尽管人们普遍认为出血是感染埃博拉病毒的常见症状,但实际上这种情况相对少见,且可能在病程后期才会出现。一些患者可能会出现内出血和外出血,包括呕吐物或粪便中带血、鼻出血、牙龈出血

等。刚果(金)卫生部门16日表示,本次流行的本迪布焦型病毒与更常见的扎伊尔型病毒在临床表现上存在差异,前者通常以发热起病,出血症状出现较晚。

世卫组织表示,埃博拉的平均病死率约为50%。在以往疫情中,病死率从25%到90%不等。虽然针对扎伊尔型病毒的疫苗和治疗方法已获许可,但目前还没有针对苏丹型或本迪布焦型病毒的疫苗或疗法获批。

对患者而言,及早补液和对症治疗可提高生存率。控制疫情则需要一系列干预措施,如临床护理、疫情监测和接触者追踪、实验室服务、预防和控制卫生机构中的感染、妥善安葬染病死者、疫苗接种以及社会动员等。